

Checkliste Plecoptera Rheinland-Pfalz nach ENTING, K. (2006): Kommentiertes Verzeichnis der in Rheinland-Pfalz nachgewiesenen Steinfliegenarten.- Lauterbornia 58: 41-55, Dinkelscherben
Häufigkeit: 0 = keine Funde seit 1970; s = selten (1 Fundort); v = vereinzelt (2 - 4 Funde); mh = mittelhäufig (5 -20 Funde); h = häufig (20 - 80 Funde); sh = sehr häufig (über 80 Funde). Überprüftes Material in Coll. Le Roi / Schoenemund: belegt = X, nicht belegt = -

	Häufigkeit in Rheinland-Pfalz	Für Rheinland-Pfalz publiziert	Eigenes Material	überprüftes Material Coll. Le Roi / Schoenemund
Perlodidae				
<i>Diura bicaudata</i> (LINNAEUS 1758)	mh	X	X	-
<i>Perlodes microcephalus</i> (PICTET 1833)	sh	X	X	-
<i>Isogenus nubecula</i> NEWMAN 1833	0	X	-	X
<i>Isoperla goertzi</i> ILLIES 1952	h	X	X	-
<i>Isoperla grammatica</i> (PODA 1761) s. lat.	sh	X	X	-
<i>Isoperla obscura</i> (ZETTERSTEDT 1840)	0	X	-	X
<i>Isoperla oxylepis</i> (DESPAX 1936)	sh	X	X	-
Perlidae				
<i>Dinocras cephalotes</i> (CURTIS 1827)	h	X	X	-
<i>Perla burmeisteriana</i> CLAASSEN 1936	mh	X	X	-
<i>Perla marginata</i> (PANZER 1799)	sh	X	X	-
<i>Marthamea selysii</i> (PICTET 1841)	0	X	-	-
Chloroperlidae				
<i>Isoptena serricornis</i> (PICTET 1841)	s	X	-	-
<i>Chloroperla tripunctata</i> (SCOPOLI 1763)	s	X	X	-
<i>Siphonoperla torrentium</i> (PICTET 1841)	sh	X	X	-
<i>Xanthoperla apicalis</i> (NEWMAN 1836)	0	X	-	X
Taeniopterygidae				
<i>Taeniopteryx nebulosa</i> (LINNAEUS 1758)	v	X	-	-
<i>Taeniopteryx schoenemundi</i> (MERTENS 1923)	0	X	-	X
<i>Brachyptera braueri</i> (KLAPÁLEK 1900)	0	X	-	X
<i>Brachyptera risi</i> (MORTON 1896)	sh	X	X	-
<i>Brachyptera seticornis</i> (KLAPÁLEK 1902)	mh	X	X	-
Nemouridae				
<i>Amphinemura borealis</i> (MORTON 1894)	0	X	-	X
<i>Amphinemura standfussi</i> (RIS 1902)	mh	X	X	-
<i>Amphinemura sulcicollis</i> (STEPHENS 1836)	mh	X	X	-
<i>Amphinemura triangularis</i> (RIS 1902)	(0)	X	-	-
<i>Protonemura intricata</i> (RIS 1902)	mh	X	X	-
<i>Protonemura meyeri</i> (PICTET 1841)	mh	X	X	-
<i>Protonemura nitida</i> (PICTET 1835)	mh	X	X	-
<i>Protonemura praecox</i> (MORTON 1894)	mh	X	X	-
<i>Protonemura risi</i> (JACOBSON & BIANCHI 1905)	mh	X	X	-
<i>Nemoura avicularis</i> MORTON 1894	v	X	X	-
<i>Nemoura cambrica</i> STEPHENS 1836	mh	X	X	-
<i>Nemoura cinerea</i> (RETZIUS 1783)	sh	X	X	-
<i>Nemoura dubitans</i> MORTON 1894	v	X	X	-
<i>Nemoura flexuosa</i> AUBERT 1949	mh	X	X	-
<i>Nemoura marginata</i> PICTET 1835	mh	X	X	-

Taxon	Häufigkeit in Rheinland-Pfalz	Literaturangaben	Eigenes Material	überprüftes Material aus Coll. Museum Koenig, Bonn
<i>Nemoura sciurus</i> AUBERT 1949	mh	X	X	–
<i>Nemurella pictetii</i> KLAPÁLEK 1900	sh	X	X	–
Capniidae				
<i>Capnia bifrons</i> (NEWMAN 1839)	h	X	X	–
<i>Capnioneura mitis</i> DESPAX 1932	v	X	X	–
Leuctridae				
<i>Leuctra albida</i> KEMPNY 1899	mh	X	X	–
<i>Leuctra aurita</i> NAVAS 1919	mh	X	–	–
<i>Leuctra braueri</i> KEMPNY 1898	mh	X	X	–
<i>Leuctra digitata</i> KEMPNY 1899	v	X	X	–
<i>Leuctra fusca</i> (LINNAEUS 1758)	h	X	X	–
<i>Leuctra geniculata</i> (STEPHENS 1836)	h	X	X	–
<i>Leuctra hippopus</i> KEMPNY 1899	mh	X	X	–
<i>Leuctra inermis</i> KEMPNY 1899	mh	X	X	–
<i>Leuctra leptogaster</i> AUBERT 1949	s	X	X	–
<i>Leuctra major</i> BRINCK 1949	s	X	X	–
<i>Leuctra nigra</i> (OLIVIER 1811)	h	X	X	–
<i>Leuctra prima</i> KEMPNY 1899	mh	X	X	–
<i>Leuctra pseudosignifera</i> AUBERT 1954	mh	X	–	–